Contribution à la connaissance de l'Histoire Naturelle de l'île de Chypre Coleoptera: Curculionidae I

par Gabriel ALZIAR*

* Jardin botanique de la Ville de Nice, 78 avenue de la Corniche Fleurie, F-06000 NICE (France)

Résumé: l'auteur donne une liste préliminaire des Curculionidae de l'île de Chypre basée sur des données de la littérature et de récoltes diverses dont les siennes propres. Parmi ces dernières, plusieurs espèces n'étaient pas encore signalées de l'île.

Mots-clés: Chypre, Curculionidae, plante-hôte, chorologie.

Summary: The author gives a preliminary list of Curculionidae from Cyprus island, based on data from litterature and various collections including its own. Among those, several species were not yet reported from the island.

Key-words: Cyprus, Curculionidae, host-plant, chorology.

La faune entomologique de Chypre est, à l'exception de quelques familles, imparfaitement connue: c'est le cas des Curculionidae pour lesquelles n'existent que quelques données éparses dans le temps et fort peu représentatives de l'ensemble de l'île. Il existe bien la liste de G.P.GEORGHIOU (1977) mais elle concerne essentiellement les "...Species of Economic Importance..." et nécessite des corrections nomenclaturales importantes. Le présent article est une synthèse de certaines données de la littérature, des recherches effectuées par l'auteur au cours de ses différents voyages et missions dans l'île, des insectes de la collection du Department of Agriculture de Nicosie dont beaucoup ont été déterminés par G.A.K.MARSHALL et donc avec exactitude tandis que certains genres sont à revoir entièrement; enfin quelques spécimens prêtés ou cédés par nos collègues G.OSELLA (L'Aquila), et P.BERGER (Meylan). Son but ainsi que celui des articles qui le suivront est de servir à l'élaboration d'une future Faune des Curculionides de Chypre.

MM. Carlo PESARINI (Milan) et Roberto CALDARA (Milano) ont effectué diverses déterminations sur les récoltes de 1974, 1977 et 1978, ce dont je les remercie bien vivement. Qu'il me soit permis de remercier aussi Mme. Joëlle DEFAY pour la qualité de ses dessins qui font ressortir le réelle beauté de la texture et de l'ornementation des Charançons. De même je tiens à remercier mon épouse qui s'est astreinte à récolter du matériel en 1977 et 1978, sur la commune d'Akaki, où elle a découvert quelques taxons intéressants (récoltes signalées par "H.ALZIAR").

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le texte: CTGN = Collection du Département de l'Agriculture (Τμημα Γεωργιας); Cat. Junk = Catalogus Coleopterorum, édité par le Dr. W. Junk; Cat. Winkler = Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, A.Winkler, 1924-1932.

Biocosme Mésogéen, Ni ce , 12(213): 65-82, (1995)

D'autre-part j'ai signalé par un "*" les espèces qui sont certainement nouvelles pour Chypre, en soulignant qu'il s'agit souvent simplement de déterminations erronées plus que de découvertes réelles.

OTIORHYNCHINAE

Otiorhynchus crassicollis Stierl., 1861. Cat. Winkler, 1932.

Otiorhynchus cypricola Rche., 1857. Cat. Winkler, 1932.

Otiorhynchus ovalipennis Boh., 1843. Panayia, Paphos, Perapedhi, Prodhromos, Moutoullas, Marathasa (CTGN).

Myllocerus damascenus Miller, 1861. Cat. Junk, 1937.

Elytrodon distincticornis Pic, 1911. Cat. Winkler, 1932.

Desbrochersella insulana M.González, 1970. Yermasoya river, GONZALEZ 1970.

Phyllobius curvipes Pic, 1919. Cat. Winkler, 1932.

Phyllobius gloriosus Dan., 1903. Cat. Winkler, 1932.

Omiamima cypricus (Seidl.), 1868. Cat. Winkler, 1932.

BRACHYDERINAE

Trachyphloeus truquii Seidl. 1868. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937.

Psalidium aurigerum Desbr., 1894. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1936; Paphos, Paralimni (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 3, 28-IV-1977 et 8-9-V-1978 (H.ALZIAR!). Fig. 1.

Polydrusus baudii (Faust), 1889. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1936.

Polydrusus rhodiacus Schilsky, 1912. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1936; Panagra (Kyrenia), 1, 8-VI-1974, (Kyrenia), 4, 28-V-1974, et Diorios (Kyrenia), 4, 28-V-1974, sur *Pistacia lentiscus*, Vassilia (Kyrenia), 1, 29-VI-1974, Lapithos (Kyrenia), 8, 31-V-1974 (tous: ALZIAR). Fig. 2.

Dichorrhinus pseudoscythropus Desbr., 1875. Cat. Winkler, 1932

Genre Strophomorphus Seidlitz: je ne citerai ici que pour mémoire les espèces citées dans la littérature ou observées car ce genreessentiellement proche-oriental demande à être révisé, ce qui n'a pas été fait depuis REITTER 1895.




Fig. 1 - Psalidium aurigerum Desbr., d'Akaki.

Strophomorphus albarius (Reiche), 1857. Athiénou (Nicosia), Panagra (Kyrénia), Diorios (Nicosia) et Bella Païs (Kyrénia), espèce commune du 26-V à 20-VI-1974, sous les pierres et les plantes, parfois sur les arbustes (ALZIAR); GEORGHIOU 1977.

Strophomorphus brevithorax Pic, 1908. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937; Paphos, Engomi, Perapedhi, Nicosia, Trimiklini, Limassol, Polis (CTGN). Diorios (Kyrenia), 1, 28-V-1974 (ALZIAR); GEORGHIOU 1977.

Strophomorphus porcellus Schönherr, 1832. Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia), 6, 22 et 24-V-1974 (ALZIAR); Diorios (Kyrénia), 1, 28-V-1974, (ALZIAR); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 14, du 26-IV au 19-V-1977 et 12, du 8 au 18-V-1978 (H.ALZIAR!).

Strophomorphus sejugatus Desbr., 1894. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1939; Famagusta, Nicosia, Larnaca, Paphos, Peyia Paphos, Kondea (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Strophomorphus sublaevigatus Desbr., 1894. Mazotos, Paphos, Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia): très commun, du 21 au 24-V-1974 (ALZIAR).

Sciaphilus innotatus Pic., 1927. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937.

Chiloneus brevithorax Desbr., 1874. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937; Pervolia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Chiloneus scythropoides Reitt., 1915. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937; Omorphita [Nicosia], Kiti (CTGN); GEORGHIOU 1977.

*Caulostrophus javeti Desbr., 1869. Diorios (Kyrenia), sur Pinus halepensis, 1, 28-V-1974 (ALZIAR).

Philopedon (Leptolepurus) meridionalis (Jacq.), 1854. Près d'Amathas [?], De VIEDMA 1964.

Sitona intermedius Küster, 1842. Amiandos, Chionistra, Asprokremo [Paphos], Trikoutsia (CTGN), mangeant les feuilles des Acacia; GEORGHIOU 1977

Sitona limosus Rossi, 1892. Peristerona, Deftera [Nicosia], Kyerou [Nicosia], Nicosia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Sitona lineatus (L.), 1758. Nicosia, Larnaca, Peristerona (CTGN); Panagra (Kyrenia), 1, 8-VI-1974 (ALZIAR); GEORGHIOU 1977, très nombreux exemplaires en mai 1977 à Akaki (Nicosia), (G. et H.ALZIAR)

*Sitona concavirostris Hochh., 1851. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, 24-V-1974 (ALZIAR); Akaki (Nicosia), 8, 28-IV à 25-V-1977 (G. et H.ALZIAR).

Sitona crinitus (Herbst), 1795. Cat. Junk, 1939; Akaki (Nicosia), 17, nombreux en avril et mai 1977 (G. et H.ALZIAR), sur Sinapis, Vicia et Anthemis.




Fig. 2 - Polydrusus rhodiacus Schilsky, de Diorios.

Sitona damascenus Stierl., 1884. Nicosia (CTGN).

*Sitona hispidulus F., 1776. Akaki (Nicosia), 3, 6 à 13-V-1977 (H.ALZIAR!).

Sitona humeralis Steph., 1831. Nicosia (CTGN).

Sitona ocellatus Küster, 1849. Famagusta, Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia), 21-V à 14-VI-1974, et Mammari (Nicosia), 1-VI-1974 (ALZIAR), en tout 17 exemplaires dont 15 ont été trouvés sur *Tamarix*; GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 4, du 6 au 23-V-1977 (H.ALZIAR!). Fig. 3.

*Sitona puncticollis Steph., 1831. Akaki (Nicosia) 1, 30-IV-1977, sous une pierre (H. ALZIAR!).

TANYMECINAE

Tanymecus dilaticollis Gyll., 1834. GEORGHIOU 1977; Pervolia (Larnaca), 18, 10-IV-1991 (EWALD!), terrain vague sableux.

BRACHYCERINAE

Brachycerus argillaceus Rche., 1857. ZUMPT 1937; Omorphita, Nicosia, Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Brachycerus chevrolati Fahrs., 1840 (=callosus Schoenh. 1833) Omorphita (CTGN); GEORGHIOU 1977 (sub B. callosus).

Brachycerus junix Licht., 1896. Famagusta, Nicosia, Omorphita, Pervolia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Brachycerus junix junix Licht., 1896. ZUMPT 1937.

Brachycerus nodulosus Rche., 1857. Famagusta, Kolossi, Pera Pedhi, Nicosia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Brachycerus sinuatus Oliv., 1907 var. lutulentus Gyll., 1833. Nicosie, ZUMPT 1937.

CLEONINAE

Conorhynchus brevirostris (Gyll.), 1834. Perivolia, Nicosia, Famagusta (CTGN).

Conorhynchus conicirostris (Oliv.), 1807. Nicosia (CTGN).

*Coniocleonus cicatricosus (Hoppe), 1795. Akaki (Nicosia), 1, 3-V-1977 (H.ALZIAR!).




Fig. 3 - Sitona ocellatus Küster, d'Akaki.

Coniocleonus crinipes Fahrs., 1842. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937.

Coniocleonus excoriatus (Gyll.), 1834. Nicosia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

*Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze), 1777. Akaki, Famagusta (CTGN); Akaki (Nicosia), 3 en mai 1977 et 3 le 18-V-1978 (G. et H.ALZIAR!).

Coniocleonus planidorsis Fairm., 1879. Cat. Winkler, 1932.

Coniocleonus vittiger Fahrs., 1842. Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Pachycerus madidus Oliv., 1807. Nicosia, Koma tou Yialou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

*Rabdorrhynchus sp. propre menetriesii (Gyll.), 1834. Genre nouveau pour l'île, espèce en cours de vérification. Droushia (Paphos), près de Pittokopos, 1, 28-IV-1995, sur *Anchusa italica* (ALZIAR).

Lixus junci Boh., 1836. Larnaca (CTGN); GEORGHIOU 1977; Ayios Vassilios (Nicosia), 11, 25 et 26-VI-1974 (ALZIAR).

Lixus ascanii L., 1767. Famagusta, (CTGN); GEORGHIOU 1977. A revoir à la lumière du travail de DIECKMANN 1980.

Lixus algirus L., 1758. Nicosia, Famagusta, Larnaka Lapithou, Kouklia, Trikoutsia, Limassol (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 1, 15-V-1978 (H.ALZIAR!).

Lixus scolopax Boh., 1836. Cat. Winkler, 1932; Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia), 24 et 25-VI-1974, et Mammari (Nicosia), 1-VI-1974: 6 exemplaires sur *Cynara cardunculus* (ALZIAR); Akaki (Nicosia), 1, 31-V-1977 (ALZIAR); lit du Dhiarizos, 1 km au nord de Khidazi (Paphos), 1, 27-IV-1991 (EWALD et ALZIAR), sur chardon; route d'Ipsonas à Khalassa (Limassol), 1, 27-IV-1991, sur Onopordum; Odhou dint. (Larnaca), 2, 17/18-IV-1993 (MAGNANI!); Parekklisha (Limassol), 3, 18-IV-1993 (MAGNANI!); Pomos dint. (Paphos), 2, 26-IV-1993 (MAGNANI!); Lyso (Paphos), 3, 28-IV-1993 (BERGER!); Drousha (Paphos), 1, 30-IV-1995 (ALZIAR), en loge nymphale dans une tige sèche d'*Echinops spinosissimus*.

Lixus cardui Oliv., 1807. Famagusta, Athalassa, Kiti (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 7, 26 et 27-IV-1977 (H.ALZIAR 1); Ayios Yeoryios (Paphos), côte en allant vers Lara, 1, 21-III-1984 (EWALD et ALZIAR); à 1 km au nord de Khidazi (Paphos), berges du Dhiarizos, 1, 27-IV-1991, sur chardon (EWALD I).

Lixus speciosus Mill., 1861. PETRI 1905; Cat. Winkler, 1932; GEORGHIOU 1977.

Larinus onopordi (F.), 1787. Panagra (Nicosia), 4, 8 et 20-VI-1974, dont 3 sur Echinops spinosissimus (ALZIAR); Ayios Chrysostomos (Kyrenia), 1, 3-VII-




Fig. 4 - Hypolixus pulvisculosus Boh., de Mammari.

1974, sur Echinops speciosissimus (ALZIAR); Akrounda (Limassol), 3, 28-IV-1994 (ALZIAR).

Larinus latus Herbst, 1784. Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus longirostris Gyll., 1836. W.Leondari (CTGN); GEORGHIOU 1977.

*Larinus centaureae Ol., 1889. Akaki (Nicosia), 1, 9-V-1977 (H.ALZIAR I).

Larinus maculatus Gyll., 1836. Nicosia, Psematismeno, Analiondas [près de Tseri], Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus orientalis Cap., 1874. Ormithi, Ay. Andronikos, Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus ovaliformis Cap., 1874. Pissouri, Paphos, Nicosia, Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 1, 9-V-1977 (H.ALZIAR!).

Larinus planus (F.), 1792. Athalassa, Nicosia, Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus siculus Boh., 1843. Nicosia, Larnaca Lapithou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus syriacus Gyll., 1836. Famagusta, Ormithi, Larnaca, Nicosia. (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 3, 26 et 27-IV-1977 (H.ALZIAR!).

Larinus ursus (F.), 1792. Famagusta, Nicosia (CTGN).

Larinus vulpes (Oliv.), 1808. Nicosia (CTGN).

*Microlarinus lareynii (J.du Val), 1852. Akaki (Nicosia), 3, 30-IX-1981, sur Tribulus terrestris (ALZIAR).

*Rhinocyllus sp. Genre non encore signalé de Chypre. Nous en avons trouvé de nombreux exemplaires à Amathus et Arménokhori (Limassol), Akaki (Nicosia) et près de Panayia (Paphos), de 1977 à 1991; à notre avis il a été systématiquement confondu avec l'espèce suivante. Détermination spécifique en cours.

Bangasternus orientalis Cap., 1873. Famagusta, Kyrenia, Limassol, (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Hypolixus nubilosus Boh., 1836. Xylophagou. (CTGN).

Hypolixus pulvisculosus Boh., 1836. Nicosia, Kyrenia, Famagusta, Pervolia (CTGN). Mammari (Nicosia), 1, 1-VI-1974, sur *Tamarix* (ALZIAR); GEORGHIOU 1977. Fig. 4.

*Temnorhinus conicirostris Oliv., 1807. Ayios Vassilios (Nicosia), 2, dont 1 sur Tamarix, 21 et 22-V-1974 (ALZIAR).

CURCULIONINAE

Rhytirrhinus deformis Rche., 1858. Nicosia, (CTGN).

*Hypera lunata (Woll.), 1854. Akaki (Nicosia), 3, 28 et 30-IV-1977, sous des pierres, 2 le 16-V-1977, sous un *Plantago* (H.ALZIAR!).

Hypera pastinacae (Rossi), 1790. Cat.Junk, 1934; Akaki (CTGN); Mammari (Nicosia), 3, 1-VI-1974 (ALZIAR).

Hypera cypris Rche. et Saulcy, 1857. Cat. Winkler, 1932.

Hypera fasciculata (Herbst), 1795. Nicosia(CTGN); GEORGHIOU 1977.

Hypera postica (Gyll.), 1813. Voroklini [Larnaca] (CTGN).

Hypera signata (Boh.), 1834. Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977.

*Hypera trilineata Marsham, 1802. Akaki (Nicosia), 1, 13-V-1977 (H.ALZIAR!)

Hypera variabilis (Herbst), 1795. Nicosia, Melia, Xylophagou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Donus cypris (Reiche & Saulcy), 1857. Cat.Junk, 1934.

Donus insularis (Cap.), 1867. Cat.Junk, 1934.

Rhytidoderes plicatus (Oliv.), 1790; GEORGHIOU 1977.

Rhytidoderes plicatus (Oliv.), 1790, var. siculus Fahrs., 1840. Nicosia, Akaki, Yeri (CTGN); Akaki (Nicosia), 2, le 3 et le 26-V-1977, (H.ALZIAR I); route de Xylophagou à Ayia Thékla (Larnaca), 1, 12-IV-1991, sous une pierre (EWALD !).

Alophus nictitans Boh., 1842. Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977.

CALANDRINAE

Amaurorhinus bewickianus (Wollaston), 1860. FOLWACZNY 1973; OSELLA et al. 1993.

Mesites cunipes (Boh.), 1837. FOLWACZNY, 1973; OSELLA et al., 1993.

Mesites pallidipennis (Boh.), 1837. Larnaka, OSELLA et al., 1993.

Rhyncholus syriacus Desbr. 1892, OSELLA et al., 1993,

Stenoscelis submuricatus (Schönh.), 1837. OSELLA et al., 1993.

Brachytemnus porcatus (Germ.), 1824. Kakoarkaga, Kapouras (CTGN); Larnake [?], Kyrenia, FOLWACZNY 1973; GEORGHIOU 1977; Larnaka, OSELLA et al., 1993.

*Calosirus nigrinus (Marsh.), 1802. Lapithos (Kyrenia), 1, 30-V-1974 (ALZIAR).

*Stenocarus cardui (Herbst), 1784. Akaki (Nicosia), 1, 3-V-1977 et 1 le 8-V-1978 (H.ALZIAR !).

Ceutorhynchus assimilis (Payk.), 1792, Nicosia (CTGN).

Ceutorhynchus beckeri Schultze, 1900. Nicosia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Ceutorhynchus cinapis Desbr., 1893. Cat. Winkler, 1932

Ceutorhynchus floralis (Payk.), 1792. Nicosia (CTGN).

Ceutorhynchus hirtulus Germ., 1824. Nicosia (CTGN).

Ceutorhynchus larvatus Schultze, 1896. Deftera (CTGN).

*Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802 (= quadridens Panz., 1795). Paphos (CTGN); Akaki (Nicosia), 2, 9 et 10-V-1977, sous Sinapis ou Anthemis; même localité, 2, 8-V-978 (H.ALZIAR!).

Sitophilus granarius (L.), 1758. (CTGN); GEORGHIOU 1977. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, 11-VI-1974.

Sitophilus oryzae (L.), 1758. (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Sitophilus sculpturatus Gyll., 1838. Importé (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855. Importé (CTGN).

*Baris alboseriata Reitter, 1908. Nord de Chypre, 1, VII-1974 (ALZIAR); Akaki (Nicosia), 1, 18-V-1977 (H.ALZIAR!).

Baris chlorizans Germ., 1824. Kiti (CTGN).

Baris timida (Rossi), 1792. Kiti, Paphos, Nicosia, Perapedhi, Agros (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia) 1, 18-V-1977 (H.ALZIAR!).

Sphenophorus piceus (Pallas), 1776. Famagusta (CTGN).

Anthonomus cyprius Marshall, 1925. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1934; Platanistasa (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Anthonomus pomorum (L.), 1758. Ayios Demetrios, Ay. Koroni, Kalapanayiotes, Moutoulla, Nicosia, Panayia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Bradybatus abeillei Desbr., 1888. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1934.

Curculio elephas (Gyll.), 1836. Larnaca, Kalochorio, Skoulli, Lapithos (CTGN): une simple observation de l'ensemble des exemplaires présents dans cette collection permet de voir qu'il y a en leur sein au moins deux espèces différentes; ils sont donc tous à revoir, GEORGHIOU 1977.

Sibinia arenariae Stephens, 1831. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, mai 1974 (ALZIAR), vu par CALDARA et cité dans sa révision (1984).

Sibinia attalica (Gyll.), 1836. Nicosia (CTGN).

Sibinia aureofulva Desbr., 1875. Ayios Vassilios, Episkopi, CALDARA 1984; Akaki (Nicosia), 1, 25-V-1977 (ALZIAR).

Sibinia phalerata Gyll., 1836. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, 21-V-1974 (ALZIAR); CALDARA 1984.

Sibinia planiuscula Desbr., 1873. Larnaka, Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Tychius bicolor Ch.Bris., 1862. Ayios Vassilios (Nicosia), 4, du 22-V au 7-VI 1974 (ALZIAR); Mammari (Nicosia), 2, 1-VI-1974 (ALZIAR); CALDARA 1986.

Tychius crypticus Caldara, 1986. Alasia, CALDARA 1986.

Tychius morawitzii Becker, 1864. Nicosia (CTGN). Exemplaires à revoir par suite des confusions possibles avec T. crypticus.

Tychius cupricolor Penecke, 1935. Akroteri, CALDARA 1990.

*Cionus olivieri Rosenh., 1838. Lapithos (Kyrenia), 1, 30-V-1974 (ALZIAR).

*Cionus schultzei Reitter., 1904. Lapithos (Kyrenia), 12, 30-V-1974 (ALZIAR).

Cionus thapsus (F.), 1792. Larnaca Lapithou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

*Corimalia minutissima (Tourn.), 1867. Panagra (Kyrenia), 13, 8-VI-1974, sur Tamarix (ALZIAR).

*Corimalia quadrivirgata (Costa), 1863. Panagra (Kyrenia), 1, 8-V1-1974, sur un Tamarix (ALZIAR).

Mecinus circulatus (Marsh.), 1802. Vatili (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Cryptorhynchus mangiferae, F., 1775. Paphos (CTGN). Accidentellement importé.

Smicronyx basalis Schultze, 1897. Limassol (CTGN).

Procas saulcyi (Rche.), 1857. Cat. Winkler, 1932.

Echinocnemus femoralis Marsh., 1950. Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Pachytychius basimaculatus Voss., 1964. Larnaka, CALDARA 1978.

Pachytychius hordei (Brullé), 1832. GEORGHIOU 1977.

Pachytychius hordei subsp. hordei. (Brullé), 1832. Nicosia, Famagusta, Larnaca (CTGN); Akaki (Nicosia), 2, 9 et 18-V-1977 (H.ALZIAR!); Larnaca, CALDARA 1978; Paralimni, Protaras (Larnaca), 1, 5-III-1995 (ALZIAR).

*Orthochaetes penicillus Gyll., 1836. Ayios Vassilios (Nicosia), 22-V-1974 (ALZIAR).

APIONINAE

Apion ochropus Germ., 1818. Platus, Krios River, mt. Troodos, Mesopotamis, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion tubiferum Gyll., 1833. Pera Pedi, Moniatis, Mt. Troodos, Krios River, BALFOUR-BROWNE 1944; Nicosia (CTGN); Skarinou (Larnaca), 1, 20-III-1984 (ALZIAR); Stavrovouni (Larnaca), 1, 26-III-1984 (ALZIAR et P.EWALD).

*Apion (Phrissotrichium) sp. Kilani (Limassol), 1, 27-III-1984 (ALZIAR): cet exemplaire se caractérise par sa couleur foncière bleue, son revêtement de soies blanches dressées et longues (comme chez A. tubiferum) et ses interstries concaves et subcarénés sur les bords (comme chez A. perrisi).

Apion violaceum Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion malvae (F.), 1775. Nicosia, forêt d'Akrotiri, mt. Troodos, Pera Pedi, Kilani, Krios River, BALFOUR-BROWNE 1944; Ayios Yeoryios, Nicosia (CTGN); Mammari (Nicosia), 2, 1-VI-1974 (ALZIAR); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 6, les 30-IV, 10 et 16-V-1977 (H.ALZIAR!).

Apion stolidum Germ., 1817. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion confluens Kirby, 1808. Kilani, Krios River, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion detritum Muls. et Rey, 1858. Ayia Mavi Monastery, BALFOUR-BROWNE 1944

Apion carduorum Kirby, 1808. Mammari (Nicosia), 1, 1-VI-1974, sur un Tamarix (ALZIAR)

Apion scalptum Muls. et Rey, 1858. Akrotiri Forest, Cherkes, Zakaki, Pera Pedi, Episcopi, BALFOUR-BROWNE 1944 (sub A. pilicorne Desbr., 1875).

Apion onopordi Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion aeneum (F.), 1775. Nicosia, Limassol, mt. Troodos, Krios River, Platus, Mesopotamis, BALFOUR-BROWNE 1944; Nicosia, entre Paléomilo et Prodépino (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 7, du 3 au 9-V-1977 et 1 le 8-V-1978 (H.ALZIAR !); Vallée des Cèdres (Paphos), 1, 20-IV, 1991, ± 1100m, battage de Cerisiers (EWALD !).

Apion radiolus Marsham, 1802. BALFOUR-BROWNE 1944; Nicosia, Pedhoulas (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 9 mâles et 3 femelles, du 3 au 25-V-1977; même localité, 1 femelle, 8-V-1978, sous Corydothymus capitatus (H.ALZIAR!).

Apion dispar (Germ.), 1817. BALFOUR-BROWNE 1944

Apion hookeri Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion semivittatum Gyll., 1833. Pedula [?], Limassol, Platus, Krios River, mt. Troodos, Mesopotamis, Pera Pedi, Kilani, BALFOUR-BROWNE 1944; Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977; Panagra (Kyrenia),10, 8-VI-1974, en battant du *Pistacia lentiscus* (ALZIAR).

Apion rufescens Gyll., 1833subsp. notatum Wagn., 1912. Limassol, Episcopi, Pera Pedi, Krios River, Kilani, Akrotiri Bay, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion corniculatum Germ., 1817. Nicosia (CTGN).

Apion longirostre Ol., 1807. Famagusta, BALFOUR-BROWNE 1944; Platres, Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Apion cruentatum Waiton, 1844. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion miniatum Germ., 1833. Episcopi, BALFOUR-BROWNE 1944 (citation de l'espèce accompagnée de l'indication "? var."). Quant aux exemplaires d'Apion "miniatum" du CTGN doivent être revus à la lumière des nouvelles conceptions concernant le sous-genre; localités citées: Nicosia, Apliki, Kondea; GEORGHIOU 1977.

Apion pubescens Kirby, 1811. Famagusta, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion atomarium Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion bifarium Balf.-Br, 1944. Platus, Krios River, mt. Troodos, Mesopotamis, Palacomylos, Pera Pedi, BALFOUR-BROWNE 1944

Apion ononicola Bach, 1854. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion fulvipes (Fourcroy), 1785 (=flavipes Payk.). BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion aestivum Germ., 1808. Akrotiri Forest, Cherkes, BALFOUR-BROWNE 1944; Ay. Amurosios (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Apion nigritarse Kirby, 1808. Pera Pedi, Krios River, Ayia Mavi, Kilani, BALFOUR-BROWNE 1944; Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Apion cyprium Balf.-Br, 1944. Limassol, Episcopi, Akrotiri Bay, BALFOUR-BROWNE 1944

Apion croceifemoratum Ksw., 1864. Mt. Troodos, BALFOUR-BROWNE 1944, (sub A. flavofemoratum var. croceifemoratum Gyll.); Lefkara (CTGN).

Apion ononis Kirby, 1808. Mt. Troodos, Platus, Krios River, Mesopotamis, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion viciae Paykull, 1798. Mt. Troodos, Krios River, Mesopotamis, Pera Pedi, BALFOUR-BROWNE 1944 (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Apion vorax Herbst, 1797. Mt. Troodos, Krios River, Mesopotamis, Platus, BALFOUR-BROWNE 1944; (CTGN); GEORGHIOU 1977; Stavros tis Psokas, 1, 21-IV-1991 (EWALD!).

Apion tenue Kirby, 1808. Episcopi, BALFOUR-BROWNE 1944.

RHYNCHITINAE

Rhynchites ruber Fairm., 1859. Morphou, Kapouti (CTGN); GEORGHIOU 1977.

OBSERVATIONS

A la lecture de cette première contribution on s'aperçoit aisément des lacunes immenses qui subsistent dans la connaissance des Curculionides de l'île de Chypre. D'une part bien des parties de l'île de donnent lieu à aucune citation, d'autre-part beaucoup de ces dernières sont assez anciennes et les insectes concernés demandent à être revus (Strophomorphus, Apion, divers Cleoninae ...), enfin on constate quelques déterminations hâtives ayant donné lieu à des confusions perpétuées dans la littérature. Il est presque banal de rappeler que le milieu insulaire est propice à la découverte lors d'études, de taxons endémiques jadis confondus avec leurs parents continentaux, voire, souvent, d'espèces ou genres bien isolés rencontrés lors de recherches de terrains un peu poussées.

BIBLIOGRAPHIE

BALFOUR-BROWNE,J., 1944. A contribution to the knowledge of the Apioninae of Cyprus. Bull. Soc. Fouad Ier Ent., 28: 147-154.

CALDARA, R., 1978. Revisione dei Pachytychius paleartici. Mem. Soc. ent. Ital., Genova, 56: 131-216.

CALDARA, R., 1985. Revisione delle Sibinia paleartiche. Mem. Soc. ent. Ital., Genova, 62/63: 24-105 (1983-1984).

CALDARA,R., 1986. Revisione dei Tychius precedentemente inclusi in Lepidotychius (N. Syn.). Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano, 127 (3-4): 141-194.

CALDARA,R., 1990. Revisione tassonomica delle specie paleartiche del genere Tychius Germar (Coleoptera Curculionidae). Mem. Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano, 25(3): 53-218.

CSIKI,E., 1934. Coleopterorum Catalogus. Pars 137. Curculionidae: Hyperinae (Dr.W.Junk, Gravenhage)

DALLA-TORRE, K.W.von, EMDEN, M.van, & EMDEN, F.van, 1936 et 1937. Coleopterorum Catalogus. Pars 147 et 153. Curculionidae: Brachyderinae I et II. (Dr.W.Junk, Gravenhage).

DIECKMANN,L., 1968. Revision der westpaläarktischen Anthonomini. Beitr. Ent., 17(3/4): 377-564.

FOLWACZNY,B., 1973. Bestimmungstabelle der paläarktischen Cossoninae ohne die nur in China und Japan vorkommenden Gattungen nebst Angaben zur Verbreitung. Ent. Blätter, 69: 65-180.

GEORGHIOU, G., 1977. The insects and mites of Cyprus. Kiphissia, 347 p.

GONZALEZ, M., 1970. El género Desbrochersella Reitter. Public. Inst. Biol. apl. Barcelone, 50: 5-16.

HOFFMANN,A., 1950. Faune de France - 52 - Coléoptères Curculionides (Première Partie). Lechevalier, Paris, p. 1-486.

HOFFMANN,A., 1954. Faune de France - 59 - Coléoptères Curculionides (Deuxième Partie). Lechevalier, Paris, p. 487-1208.

HOFFMANN, A., 1958. Faune de France - 62 - Coléoptères Curculionides (Troisième Partie). Librairie de la Faculté des Sciences, Paris, p. 1209-1839.

LODOS, N., 1971. Preliminary list of Curculionidae with notes on distribution and biology of species in Turkey. 1. Sitona Germar. Yearbook Faculty Agr. Univ. Ege, Izmir, 2(1): 1-35.

OSELLA,G., ZUPPA,A. et LODOS,N., 1993. I Cossoninae d'Anatolia e regioni viciniori. Fragm. Ent., Roma, 24(2): 243-305.

VIEDMA,G.A.de, 1964. Contribución al conocimiento de la tribu Cneorrhini: revision de los géneros Attactagenus Tournier y Philopedon Stephens y

consideraciones acerca de Cneorhinus Schönherr, Leptolepurus Desbrochers, Heydeonymus Desbrochers y Bletonius Hoffmann. Eos, Madrid, 40: 455-491.

PETRI, K., 1905. Bestimmungs-Tabelle der mir bekannt gewordenen Arten der Gattung Lixus Fab. aus Europa und den angrenzenden Gebieten. 2. Forsetzung. Wiener Ent. Zeit., 24(3-4): 101-116.

TEMPERE,G. et PERICART,J., 1989. Faune de France -74- Coléoptères Curculionidae, quatrième partie. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 534 pp.

WINKLER, A., 1924-32. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Albert Winkler ed., Wien, 1698 pp.

ZUMPT,F., 1937. Revision der paläarktischen Brachycerus-Arten. Curculioniden-Studien XXVII. Ent. Blätter, 33: 348-374 et 385-426.

ZURCHER, 1919. La vraie provenance du Polydrosus rhodiacus Schilsky. Bull. Soc. ent. France, 1919: 159.